

資料②

【参考】外部委託検査細目内訳

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	予定数量	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
1	1	トロンボモジュリン	血清	CLEIA	239	204	2.1-4.1	1.8-3.9	FU/mL	2~4
1	2	プロテインS抗原量(トール)	血漿	EIA	294	162	65-135	65-135	%	2~6
1	3	凝固活性 第Ⅱ因子(F2)	血漿	凝固時間法	1136	223	75-135	75-135	%	2~4
1	4	凝固活性 第Ⅴ因子(F5)	血漿	凝固時間法	3	223	70-135	70-135	%	2~4
1	5	凝固活性 第Ⅶ因子(F7)	血漿	凝固時間法	3	223	75-140	75-140	%	2~4
1	6	凝固活性 第Ⅷ因子(F8)	血漿	凝固時間法	351	223	60-150	60-150	%	2~4
1	7	凝固活性 第Ⅸ因子(F9)	血漿	凝固時間法	8	223	70-130	70-130	%	2~4
1	8	凝固活性 第Ⅹ因子(F10)	血漿	凝固時間法	1137	223	70-130	70-130	%	2~4
1	9	凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11)	血漿	凝固時間法	3	223	75-145	75-145	%	2~4
1	10	凝固活性 第ⅩⅡ因子(F12)	血漿	凝固時間法	11	223	50-150	50-150	%	2~4
1	11	凝固抑制 第Ⅷ(8)因子	血漿	ベセスダ法	2	148	検出せず	検出せず	ベセスダU/mL	2~4
1	12	フォン・ウィルブラント因子活性	血漿	固定血小板凝集法	17	132	60-170	60-170	%	2~4
1	13	α2PIⅡラズミン複合体(PIC)	血漿	LPⅡA	297	158	0.8以下	0.8以下	μg/mL	2~4
1	14	ADAMTS-13(活性)	血漿	ELISA	11	400	なし	なし	%	2~5
1	15	凝固活性 第ⅩⅢ因子(F13)	血漿	合成基質法	1	223	70-140	70-140	%	2~4
1	16	HIT-IgG	血漿	ラテックス比濁法	83	390	1.00未満	1.00未満	U/mL	2~6
1	17	ADAMTS-13インヒター	血漿 (3.2%クエン酸N	ELISA	2	1,000	後天性TTP基準 0.5以上	後天性TTP基準 0.5以上	BU/mL	2~5
2	18	フォンウィルブラント因子マルチマー解析	血漿	SDSアガロースゲル電気泳動法	2	適用外	NORMALパターン	NORMALパターン	なし	7~13
2	19	フオクトラフ(凝固5)	血漿	SDSアガロースゲル電気泳動法後に写真撮影	1	適用外	なし	なし	なし	14~30
3	20	アルブミン定量	血清	ネフロメトリ法	26	11	3900-4900	3900-4900	mg/dL	2~4
3	21	MMP-3(マトリックスメタプロテイナーゼ3)	血清	LTIA	63	116	36.9-121	17.3-59.7	ng/mL	2~4
3	22	便虫卵ー塗抹	糞便	直接塗抹法	2	20	(-)	(-)	なし	4~6
4	23	アルドラーゼ	血清	UV法	6	11	2.1~6.1	2.1~6.1	U/L	2~4
4	24	アデノシンデアミナーゼ	血清	酵素法	53	32	5.0~20.0	5.0~20.0	U/L	2~4
4	25	リゾチウム	血清	比濁法	14	適用外	5.0~10.2	5.0~10.2	μg/mL	2~4
4	26	LDアイソザイム	血清	アガロースゲル	29	48	別紙シート参照	別紙シート参照	%	2~4
4	27	ALPアイソザイム	血清	アガロースゲル	20	48	別紙シート参照	別紙シート参照	%	2~4
4	28	CKアイソザイム	血清	アガロースゲル	23	55	別紙シート参照	別紙シート参照	%	2~4
4	29	腓アミラーゼ	血清	JSCC標準化対応法	1	48	21~64	21~64	U/L	2~4
4	30	アミラーゼアイソザイム	血清	アガロース電気泳動法	14	48	TOTAL-S 36.0-84.3 TOTAL-P 15.7-64.0	TOTAL-S 36.0-84.3 TOTAL-P 15.7-64.0	%	2~4
4	31	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール	血清	酵素法	269	80	14.9~44.7	12.4~28.8	μg/mL	2~4
4	32	ヒアルロン酸	血清	ラテックス凝集免疫比濁法	507	184	50.0以下	50.0以下	ng/mL	2~4
4	33	アミノ酸分画	血漿	LC/MS	11	1,176	別紙シート参照	別紙シート参照	nmol/mL	4~6
4	34	アミノ酸分画(尿)	尿	HPLC	5	1,176	別紙シート参照	別紙シート参照	μmol/day	7~10
5	35	ベントシン	血漿	ELISA	1263	118	0.00915-0.0431	0.00915-0.0431	μg/mL	14~17
6	36	乳酸	除蛋白上清液	酵素法	35	47	4.2-17.0	4.2-17.0	mg/dL	2~3
6	37	ヒルビン酸	除蛋白上清液	酵素法	36	47	0.30-0.90	0.30-0.90	mg/dL	2~3
6	38	ケトン体分画	血清	酵素サイクリング法	50	59	7ケトンタイ 131以下 ACAC 55以下 3-OHBA 85以下	7ケトンタイ 131以下 ACAC 55以下 3-OHBA 85以下	μmol/L	2~3
6	39	有機酸スクリーニング	尿	GC-MSD法	11	適用外	検出せず	検出せず	なし	9~17
7	40	血清蛋白分画	血清	キャピラリー電気泳動法	314	18	別紙シート参照	別紙シート参照	%	2~3
7	41	酸化LDL(MDA-LDL)	血清	ELISA	468	194	45才未満 46-82 45才以上 61-105	45才未満 46-82 45才以上 61-105	U/L	3~10
7	42	KL-6	血清	CLEIA	2060	114	500未満	500未満	U/mL	2~3
7	43	SP-D	血清	EIA	1380	136	110未満	110未満	ng/mL	3~5
7	44	総胆汁酸	血清	酵素法	126	47	10.0以下	10.0以下	μmol/L	1~2
7	45	脂肪酸4分画	血清	LC-MS/MS法	126	417	別紙シート参照	別紙シート参照	μg/ml	4~5
7	46	リパーゼ	血清	酵素法	57	24	5-35	5-35	U/L	2~3
7	47	レムナト様リボ蛋白コレステロール	血清	酵素法	285	184	7.5以下	7.5以下	mg/dL	2~3
7	48	アポリボ蛋白A-I	血清	TIA	957	31	119-155	126-165	mg/dL	1~2
7	49	アポリボ蛋白A-II	血清	TIA	957	31	25.9-35.7	24.6-33.3	mg/dL	1~2
7	50	アポリボ蛋白B	血清	TIA	957	31	73-109	66-101	mg/dL	1~2
7	51	アポリボ蛋白C-II	血清	TIA	932	31	1.8-4.6	1.5-3.8	mg/dL	1~2
7	52	アポリボ蛋白C-III	血清	TIA	932	31	5.8-10.0	5.4-9.0	mg/dL	1~2
7	53	アポリボ蛋白E	血清	TIA	932	31	2.7-4.3	2.8-4.6	mg/dL	1~2
7	54	レチノール結合蛋白	血清	ラテックス凝集比濁法	75	136	2.7-6.0	1.9-4.6	mg/dl	2~3
7	55	遊離コレステロール	血清	酵素法	5	11	34-66	34-66	mg/dL	1~2
8	56	ビタミンB1	EDTA加血	LC-MS/MS	296	246	2.6-5.8	2.6-5.8	μg/dL	4~6
8	57	ビタミンB12	血清	CLIA	1101	144	233-914	233-914	pg/mL	2~3
8	58	葉酸	血清	CLIA	1008	154	3.6-12.9	3.6-12.9	ng/ml	2~3
8	59	カルニチン分画	血清	酵素サイクリング法	18	95+95	総 45-91 遊離 36-74 アシル 6-23	総 45-91 遊離 36-74 アシル 6-23	μmol/L	2~3

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	予定数量	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
8	60	1α,25(OH)2ビタミンD	血清	RIA	29	388	20-60	20-60	pg/mL	3~6
9	61	マグネシウム	尿	酵素法	20	11	設定なし	設定なし	mg/dL	2~3
10	62	銅	血清	比色法	120	23	66 ~ 130	66 ~ 130	μg/dL	1~2
10	63	亜鉛 (Zn)	血清	原子吸光法	282	140	80-130	80-130	μg/dL	2~3
10	64	尿中銅	尿	原子吸光法	2	23	36以下	36以下	μg/L	4~10
11	65	VMA	酸性蓄尿	LC-MS/MS	95	90	設定なし	設定なし	mg/L	3~4
12	66	テオフィリン	血清	EIA	17	470	10-20	10-20	μg/mL	2~4
12	67	ケンタマイシン	血清	EIA	26	470	Peak 15~20 Trough 1未満	Peak 15~20 Trough 1未満	μg/mL	2~4
12	68	ゾニサド	血清	ラテックス凝集法	5	470	10~30	10~30	μg/mL	2~4
12	69	アブリジン	血清	LC-MS/MS	11	470	0.25~1.25	0.25~1.25	μg/mL	3~5
12	70	ジソピラド	血清	EIA	27	470	2.0~5.0	2.0~5.0	μg/mL	2~4
12	71	リトカイン	血清	EIA	5	470	1.2~5.0	1.2~5.0	μg/mL	2~4
12	72	アミカシン	血清	EIA	21	470	Peak 50~60 Trough 4未満	Peak 50~60 Trough 4未満	μg/mL	2~4
12	73	レベチラセタム	血漿	LC-MS/MS	50	470	設定なし	設定なし	μg/mL	3~5
12	74	ラモキシリン	血漿	LC-MS/MS	5	470	設定なし	設定なし	μg/mL	3~5
12	75	フェノバルビタール	血清	EIA	30	470	10~25	10~25	μg/mL	2~4
12	76	キニジン	血清	EIA	20	470	2.0~6.0	2.0~6.0	μg/mL	2~8
12	77	ペランパネル	血しょう	LC-MS/MS	18	470	設定なし	設定なし	ng/mL	2~4
12	78	ニコサド	血漿	LC/MS/MS	17	470	なし	なし	μg/mL	3~5
13	79	ホモスチニン	血漿	LC-MS/MS	558	287	5-15	5-15	nmol/mL	3~5
13	80	成長ホルモン (GH)	血清	ECLIA法	111	111	2.47以下	0.13-9.88	ng/mL	2~3
13	81	LH	血清	CLIA	86	111	0.79-5.72	別紙シート参照	mIU/mL	2~3
13	82	FSH 卵胞刺激ホルモン	血清	CLIA	87	111	2.00-8.30	別紙シート参照	mIU/mL	2~3
13	83	ACTH	血漿	ECLIA	1380	194	7.2-63.3	7.2-63.3	pg/mL	2~3
13	84	プロラクチン (PRL)	血清	CLIA	147	98	3.58-12.78	6.12-30.54	ng/mL	2~3
13	85	ソマトジンC	血清	IRMA	69	218	別紙シート参照	別紙シート参照	ng/mL	3~5
13	86	T3	血清	CLIA	27	102	64~152	64~152	ng/dL	2~3
13	87	T4	血清	CLIA	38	111	4.87~11.72	4.87~11.72	μg/dL	2~3
13	88	サイログロブリン	血清	ECLIA	150	133	33.7以下	33.7以下	ng/mL	2~3
13	89	サイロイドテスト	血清	PA	168	37	100未満	100未満	倍	2~3
13	90	マイクロゾームテスト	血清	PA	159	37	100未満	100未満	倍	2~3
13	91	抗サイログロブリン抗体	血清	CLIA	632	144	4.11未満	4.11未満	IU/mL	2~3
13	92	TSHレセプター抗体	血清	ECLIA	870	226	2.0未満	2.0未満	IU/L	2~3
13	93	TSAb TSH刺激レセプター抗体	血清	EIA	582	340	120以下	120以下	%	3~6
13	94	TBG サイロキシン結合グロブリン	血清	CLEIA	1	130	14-31	14-31	μg/mL	2~5
13	95	カルシトニン	血清	ECLIA	30	137	5.15以下	3.91以下	pg/mL	2~3
13	96	PTH-Intact	血漿	ECLIA	774	170	10-65	10-65	pg/mL	2~3
13	97	PTHrP-Intact	血漿	IRMA	24	194	1.1未満	1.1未満	pmol/L	5~7
13	98	メタネフリン分画測定	尿	LC-MS/MS	234	221	メタネフリン 0.05-0.20 ノルメタネフリン 0.10-0.28	メタネフリン 0.05-0.20 ノルメタネフリン0.10-0.28	mg/day	3~4
13	99	レニン活性	血漿	EIA	2072	100	別紙シート参照	別紙シート参照	ng/mL/hr	3~4
13	100	レニン濃度 (PRC)	血漿	CLEIA法	62	108	随時1.2~35.4	随時1.2~35.4	pg/mL	2~4
13	101	アルドステロン	血漿	CLEIA法	1950	125	173以下	173以下	pg/mL	2~3
13	102	アルドステロン	尿	CLEIA法	50	125	10以下	10以下	μg/day	3~5
13	103	アンギオテンシン I 変換酵素 (ACE)	血清	笠原法	788	144	7.7-29.4	7.7-29.4	IU/L	1~2
13	104	遊離コルチゾール	尿	RIA	63	127	11.2-80.3	11.2-80.3	μg/day	2~4
13	105	テストステロン	血清	CLIA	27	125	別紙シート参照	別紙シート参照	ng/mL	2~3
13	106	プロジェステロン	血清	CLIA	33	151	別紙シート参照	別紙シート参照	ng/ml	2~3
13	107	エストラジオール (E2)	血清	CLIA	39	177	別紙シート参照	別紙シート参照	pg/mL	2~3
13	108	DHEA-S	血清	CLEIA	18	174	別紙シート参照	別紙シート参照	μg/dL	2~3
13	109	インシュリン抗体	血清	RIA	213	110	濃度125未満、結合率0.4未満	濃度125未満、結合率0.4未満	濃度NU/ML 結合	3~6
13	110	エリスロポエチン	血清	CLEIA	354	209	4.2-23. 7	4.2-23. 7	mIU/mL	2~3
13	111	バソプレシン	血しょう	RIA	50	235	水制限 4.0以下 自由飲水 2.8以下	水制限 4.0以下 自由飲水 2.8以下	pg/mL	5~7
13	112	17-KS7分画	蓄尿	GC-MS	1	213	別紙シート参照	別紙シート参照	mg/day	5~7
13	113	NT-proBNP	血清	ECLIA	188	136	125 以下	125 以下	pg/mL	2~3
13	114	トリプシン	血清	EIA	1	189	100-550	100-550	ng/mL	3~5
13	115	尿中カテコールアミン3分画	酸性蓄尿	HPLC	282	170	アドレナリン: 1.1~22.5 ノルアドレナリン: 29.2~118 ドーパミン : 100~1000	アドレナリン: 1.1~22.5 ノルアドレナリン: 29.2~118 ドーパミン : 100~1000	μg/day	3~5
13	116	カテコールアミン3分画	血漿	HPLC	488	170	アドレナリン: 0.17以下 ノルアドレナリン: 0.15~0.57 ドーパミン : 0.03以下	アドレナリン: 0.17以下 ノルアドレナリン: 0.15~0.57 ドーパミン : 0.03以下	ng/mL	3~5
14	117	IgE (RIST)	血清	FEIA	176	100	170 以下	170 以下	IU/mL	2~3
14	118	MAST36	血清	CLEIA	15	1,430	クラス0 測定値 1.39以下	クラス0 測定値 1.39以下	LC	3~6
15	119	ブレアルブミン	血清	免疫比濁法	450	107	22.0~40.0	22.0~40.0	mg/dL	2~4
15	120	β2-MG(血清)	血清	ラテックス凝集免疫法	74	104	1.0~1.9	1.0~1.9	mg/L	2~4
15	121	β2-MG(尿)	部分尿	ラテックス凝集免疫法	1	104	230以下	230以下	μg/L	2~4
15	122	ハプトグロブリン	血清	ネフェロメトリー法	99	136	1-1型 83-209 2-1型 66-218 2-2型 25-176	1-1型 83-209 2-1型 66-218 2-2型 25-176	mg/dL	2~4
15	123	アミロイド蛋白A SAA	血清	ラテックス凝集免疫法	135	47	8.0以下	8.0以下	μg/mL	2~4

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	予定数量	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
15	124	セルロプラスミン	血清	ネフェロメトリー法	11	90	21～37	21～37	mg/dL	2～4
15	125	トランスフェリン	血清	免疫比濁法	380	60	190～300	200～340	mg/dL	2～4
15	126	トランスフェリン	蓄尿または部分尿	ラテックス凝集比濁法	1	104	蓄尿 0.80以下 Cre換算値 1.00以下	蓄尿 0.80以下 Cre換算値 1.00以下	mg/day mg/g・CRE	2～4
15	127	クリオグロブリン	血清	寒冷沈澱法	161	42	陰性	陰性	なし	4～6
15	128	ミオグロビン	専用容器部分尿	RIA(二抗体法)	14	139	10以下	10以下	ng/mL	2～5
15	129	ミオシン軽鎖 I	血清	EIA	5	184	2.5以下	2.5以下	ng/mL	2～4
15	130	心筋トロポニン I	血清	CLEIA	768	115	0.50以下	0.50以下	ng/mL	4～10
15	131	P-Ⅲ-P	血清	CLIA	36	140	3.62～9.52	3.62～9.52	ng/mL	2～4
15	132	Ⅳ型コラーゲン	血清	ラテックス凝集比濁法	455	139	150以下	150以下	ng/mL	2～4
15	133	Ⅳ型コラーゲン7S〔CLEIA〕	血清	CLEIA	374	148	6以下	6以下	ng/mL	3～5
15	134	免疫電気泳動	血清	免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)	459	170	なし	なし	なし	2～4
15	135	尿中免疫電気泳動	部分尿	免疫電気泳動法・免疫固定法	575	201	なし	なし	なし	2～4
15	136	オリゴクロナルバンド	髄液および血清	アガロースゲル電気泳動法または等電点電気泳動	26	522	検出せず	検出せず	なし	3～5
15	137	IgG(髄液)	髄液	免疫比濁法	62	38	髄液なし	髄液なし	mg/dL	2～4
15	138	IgGサブクラスIgG4	血清	ラテックス免疫比濁法	273	377	11～121	11～121	mg/dL	4～11
15	139	補体価(CH50)	血清	Mayer法相対比濁法	447	38	25.0～48.0	25.0～48.0	CH50/mL	3～5
15	140	シスチン C	血清	金コロイド凝集法	1797	118	0.63～0.95	0.56～0.87	mg/L	2～4
15	141	プロカルシトニン	血清	CLEIA	603	292	0.05以下 敗血症(細菌性)鑑別診断のカットオフ値 0.50未満 敗血症(細菌性)重症度判定のカットオフ値 2.00以上	0.05以下 敗血症(細菌性)鑑別診断のカットオフ値 0.50未満 敗血症(細菌性)重症度判定のカットオフ値 2.00以上	ng/mL	2～4
15	142	IGA(髄液)	髄液	免疫比濁法	2	38	110～410	110～410	mg/dL	2～4
15	143	IGM(髄液)	髄液	免疫比濁法	1	38	33～190	46～260	mg/dL	2～4
15	144	C1Q	血清	ネフェロメトリー	1	適用外	8.8～15.3	8.8～15.3	mg/dL	2～8
15	145	免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比	血清	ネフェロメトリー	225	388	遊離KAPPA型: 3.3～19.4 遊離LAMBDA型: 5.7～26.3 KAPPA/LAMBDA比: 0.26～1.65	遊離KAPPA型: 3.3～19.4 遊離LAMBDA型: 5.7～26.3 KAPPA/LAMBDA比: 0.26～1.65	mg/L	3～5
15	146	尿L-FABP	尿	CLEIA	314	210	L-FABPCRカンザンチ 部分尿 8.4以下	L-FABPCRカンザンチ 部分尿 8.4以下	L-FABP 濃度(CLEIA) ng/mL L-FABP クレアチニン換算 値 μg/gCr	2～4
16	147	NTx(血清)	血清	ELISA	3	156	9.5～17.7	閉経前: 7.5～16.5 閉経後: 10.7～24.0 骨折リスク カットオフ値 16.5 骨量減少 カットオフ値 13.6	nmolBCE/L	2～4
16	148	骨型アルカリフォスファターゼ	血清	CLEIA	3	161	3.7～20.9	閉経前 2.9～14.5 閉経後 3.8～22.6	μg/L	2～4
17	149	DUPAN-2	血清	EIA	20	118	150以下	150以下	U/mL	3～5
17	150	PIVKA II	血清	CLEIA	534	139	40未満	40未満	mAU/mL	2～3
17	151	エラスターゼⅠ	血清	LA	14	126	300以下	300以下	ng/dL	2～3
17	152	CA125	血清	CLIA	176	144	35.0以下	35.0以下	U/mL	2～3
17	153	PSA(高感度)	血清	CLEIA	213	127	4.00以下	4.00以下	ng/mL	2～3
17	154	塩基性フィブリン(BFP)	血清	EIA	8	150	75未満	75未満	ng/mL	3～6
17	155	CA72-4	血清	ECLIA	44	146	8.0以下	8.0以下	U/mL	2～3
17	156	可溶性IL-2レセプター	血清	CLEIA	1265	438	121～613	121～613	U/mL	2～3
17	157	NSE	血清	ECLIA	96	146	16.3以下	16.3以下	ng/mL	2～3
17	158	ProGRP	血清	CLIA	113	175	46.0未満	46.0未満	pg/mL	2～3
17	159	シフラ21-1	血清	CLIA	80	162	3.5以下	3.5以下	ng/mL	2～3
17	160	SCC抗原	血清	CLIA	194	107	1.5以下	1.5以下	ng/mL	2～3
17	161	SLX	血清	IRMA	65	148	38.0以下	38.0以下	U/mL	2～4
17	162	CA15-3	血清	CLIA	11	118	31.3以下	31.3以下	U/mL	2～3
17	163	Span-1	血清	IRMA	5	146	30以下	30以下	U/mL	2～5
17	164	AFプレクシン分画	血清	LBA	462	190	L3分画 10.0未満	L3分画 10.0未満	%	3～4
17	165	M2BPGi	血清	CLEIA	470	194	判定:陰性 C.O.I:1.00未満	判定:陰性 C.O.I:1.00未満	なし	2～3
17	166	TPA	血清	CLIA	14	110	75 未満	75 未満	U/L	2～3
17	167	NCC-ST-439	血清	EIA	6	118	4. 5 未満	49歳以下 :7.0未満 50歳以上 :4.5未満	U/mL	3～4
18	168	ASO	血清	LA	195	15	200以下	200以下	IU/mL	1～2
18	169	抗ストレプトキナーゼ ASK	血清	PA	162	29	2560未満	2560未満	倍	2～3
18	170	TP抗体定量	血清	LA	5	53	陰性 10.0未満 判定保留 10.0-19.9 陽性 20.0以上	陰性 10.0未満 判定保留 10.0-19.9 陽性 20.0以上	T.U	2～3
18	171	FTA-ABS IgG	血清	IFA	9	138	(-)	(-)	なし	5～7
18	172	FTA-ABS IgM	血清	IFA	3	適用外	陰性	陰性	なし	5～9
18	173	マイコプラズマ抗体価(CF)	血清	CF	6	32	4未満	4未満	倍	2～5
18	174	マイコプラズマ抗体価(PA)	血清	PA	11	32	40未満	40未満	倍	2～3
18	175	クレンジアトラコマトイスDNA	拭い液	ロジュ/PCR法	162	198	検出せず	検出せず	なし	2～3
18	176	クレンジア ニューモニエIgA・IgG	血清	EIA	23	70+75	IgG 判定(-) EIU 30未満 IgA 判定(-) EIU 8未満	IgG 判定(-) EIU 30未満 A 判定(-) EIU 8未満	Ig なし	3～5
18	177	H・ビロリIgG抗体(国内株)	血清	LA	18	80	陰性(-) 10U/mL未満	陰性(-) 10U/mL未満	U/mL	2～3
18	178	トキソプラスマ抗体IgG	血清	CLEIA	102	93	判定(-) 1.6未満	判定(-) 1.6未満	IU/mL	2～3
18	179	トキソプラスマ抗体IgM	血清	CLEIA	254	95	判定(-) 0.83未満	判定(-) 0.83未満	IU/mL	2～3

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	予定数量	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
18	180	カンジダマンナン抗原	血清	ELISA	18	134	0.05未満	0.05未満	U/ml	3～5
18	181	アスペルギルス抗原:ELISA	血清	EIA	29	161	判定(-) index0.5未満	判定(-) index0.5未満	なし	2～4
18	182	ウイルス抗体価(NT)	血清	NT	269	79	ウイルス・方法により4未満、8未満、10未満など	ウイルス・方法により4未満、8未満、10未満など	倍	11～16
18	183	ウイルス抗体価(CF・HI)	血清	CF・HI	516	79	ウイルス・方法により4未満、8未満、10未満など	ウイルス・方法により4未満、8未満、10未満など	倍	3～7
18	184	EBウイルスEADR IgA	血清	FAT	8	79	10未満	10未満	倍	3～4
18	185	EBウイルスEADR IgG	血清	FAT	23	212	10未満	10未満	倍	3～4
18	186	EBウイルスEBNA	血清	FAT	146	79	10未満	10未満	倍	3～4
18	187	EBウイルス抗VCA IgA	血清	FAT	9	79	10未満	10未満	倍	3～4
18	188	EBウイルス抗VCA IgG・IgM	血清	FAT	333	212	10未満	10未満	倍	3～4
18	189	サイトメガロウイルスIgG・IgM抗体	血清	CLIA	515	212	サイトメガロウイルスIgG EIA価 6.0未満、判定(-) サイトメガロウイルスIgM インデックス 0.85未満、判定(-)	サイトメガロウイルスIgG EIA価 6.0未満、判定(-) サイトメガロウイルスIgM インデックス 0.85未満、判定(-)	AU/mL	3～5
18	190	ハルボウイルスB19 IgM	血清	EIA	86	212	インデックス0.80未満・判定(-)	インデックス0.80未満・判定(-)	なし	3～9
18	191	ムンプスウイルスIgG・IgM	血清	EIA	57	212	ムンプスウイルスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) ムンプスウイルスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	ムンプスウイルスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) ムンプスウイルスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	なし	3～5
18	192	水痘帯状ヘルペスIgG・IgM	血清	EIA	309	212	水痘帯状ヘルペスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 水痘帯状ヘルペスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	水痘帯状ヘルペスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 水痘帯状ヘルペスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	なし	3～5
18	193	単純ヘルペスウイルスIgG・IgM抗体	髄液	EIA	290	212	単純ヘルペスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 髄液: 0.20未満 判定(-) 単純ヘルペスIgM index:0.08未満 判定(-) 髄液測 定での基準値設定なし	単純ヘルペスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 髄液: 0.20未満 判定(-) 単純ヘルペスIgM index:0.08未満 判定(-) 髄液測 定での基準値設定なし	なし	3～5
18	194	風疹ウイルスIgG・IgM	血清	EIA	86	212	風疹ウイルスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 風疹ウイルスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	風疹ウイルスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 風疹ウイルスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	なし	3～5
18	195	麻疹ウイルスIgG・IgM	血清	EIA	50	212	麻疹ウイルスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 麻疹ウイルスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	麻疹ウイルスIgG EIA価 2.0未満、判定(-) 麻疹ウイルスIgM インデックス 0.80未満、判定(-)	なし	3～5
18	196	HTLV-1抗体:WB	血清	ラインプロット	14	425	陰性(-)	陰性(-)	なし	3～9
18	197	HTLV-1抗体:CLEIA	血清	CLIA	243	168	判定(-)、S/CO 1.00未満	判定(-)、S/CO 1.00未満	なし	2～3
18	198	HIV-1 RNA定量:TaqMan	血漿	ロシュ/リアルタイムPCR法	5	520	定量結果 20未満 増幅反応シグナル 検出せず	定量結果 20未満 増幅反応シグナル 検出せず	コピー/mL	3～4
18	199	HIV-1:ウエスタンブロット	血清	ウエスタンブロット法	3	280	陰性(-)	陰性(-)	なし	3～6
18	200	HA抗体-IgM	血清	CLIA	15	146	判定(-) S/CO 0.80未満	判定(-) S/CO 0.80未満	なし	2～3
18	201	HA抗体-IgG	血清	CLIA	12	146	判定(-) S/CO 1.00未満	判定(-) S/CO 1.00未満	なし	2～3
18	202	HBe抗原:CLIA	血清	CLIA	30	104	判定(-) S/CO 1.00未満	判定(-) S/CO 1.00未満	なし	2～3
18	203	HBe抗体:CLIA	血清	CLIA	27	104	判定(-) 抑制率50%未満	判定(-) 抑制率50%未満	%	2～3
18	204	HBe抗体-IgM	血清	CLIA	18	146	判定(-) S/CO 1.00未満	判定(-) S/CO 1.00未満	なし	2～3
18	205	HBV-DNA定量:TaqMan	血清	ロシュ/リアルタイムPCR法	1010	271	定量結果:1.0未満、増幅反応シグナル:検出せず	定量結果:1.0未満、増幅反応シグナル:検出せず	LOG IU/ml	3～4
18	206	HCVコア抗原	血清	CLIA	1203	108	3.0未満	3.0 未満	fmol/L	2～3
18	207	HCV-RNA定量:TaqMan	血清	ロシュ/リアルタイムPCR法	29	437	定量結果 1.2未満 増幅反応シグナル 検出せず	定量結果 1.2未満 増幅反応シグナル 検出せず	LOG IU/ML	3～4
18	208	サイトメガロ:アンチゲネミア	EDTA加血液	間接酵素抗体法	65	377	(-)	(-)	-	2～3
18	209	ブレゼプシン	ヘパリン血漿	CLEIA	162	301	敗血症診断のカットオフ値 500	敗血症診断のカットオフ値 500	pg/mL	2～3
18	210	VZV:PCR	血清	リアルタイムPCR法	9	適用外	100 未満	100 未満	コピー/mL	2～4
18	211	単純ヘルペス:PCR	血清	リアルタイムPCR法	17	適用外	100 未満	100 未満	コピー/mL	2～4
18	212	ウイルス分離	その他	組織培養法	9	適用外	陰性	陰性	設定なし	10～30
18	213	ウイルス同定	その他	同定ウイルスにより異なる	9	適用外	設定なし	設定なし	設定なし	10～30
19	214	単純ヘルペス1型:NT	血清	NT	1	79	4 未満	4 未満	倍	10～15
19	215	単純ヘルペス2型:NT	血清	NT	1	79	4 未満	4 未満	倍	10～15
20	216	ルーブスアンチコアラント	血漿	リン脂質中和法	600	281	1.16以下	1.16以下	SCT比	2～4
20	217	ミエリンベースック蛋白	髄液	ELISA	27	577	102以下	102以下	pg/mL	3～9
20	218	IgG型リウマチ因子	血清	ELISA	41	203	2.0未満	2.0未満	なし	2～4
20	219	抗ストリン化ヘパチン(CCP)抗体	血清	CLEIA	254	204	4.5未満	4.5未満	U/mL	2～4
20	220	MPO-ANCA	血清	CLEIA	690	265	3.5未満	3.5未満	IU/mL	2～4
20	221	PR3-ANCA	血清	CLEIA	678	267	3.5未満	3.5未満	IU/mL	2～4
20	222	抗アセチルコリンセフター抗体	血清	RIA	24	822	0.2以下	0.2以下	nmol/L	3～7
20	223	抗核抗体(ANA)	血清	FA	1221	105	40未満	40未満	倍	2～4
20	224	抗セントロミア抗体	血清	ELISA	158	179	10.0未満	10.0未満	なし	2～4
20	225	抗ミトコンドリア抗体	血清	FA	143	186	陰性(20未満)	陰性(20未満)	倍	2～4
20	226	抗ミトコンドリア抗体M2	血清	CLEIA	69	194	7.0未満	7.0未満	なし	2～4
20	227	抗RNP抗体	血清	CLEIA	408	144	10.0未満	10.0未満	U/mL	2～4
20	228	抗Scl-70抗体	血清	CLEIA	206	161	10.0未満	10.0未満	U/mL	2～4
20	229	抗Sm抗体	血清	CLEIA	473	151	10.0未満	10.0未満	U/mL	2～4
20	230	抗SS-A抗体	血清	CLEIA	503	163	10.0未満	10.0未満	U/mL	2～4
20	231	抗SS-B抗体	血清	CLEIA	410	161	10.0未満	10.0未満	U/mL	2～4
20	232	抗ss-DNA IgG抗体	血清	ELISA	173	168	25以下	25以下	AU/mL	2～4
20	233	抗糸球体基底膜抗	血清	CLEIA	180	270	3.0未満	3.0未満	U/mL	2～4
20	234	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清	ELISA	960	146	16未満	16未満	IU/mL	2～4
20	235	抗CLβ 2GPI複合体抗体	血清	ELISA	659	223	3.5 以下	3.5 以下	U/mL	2～4
20	236	抗カルシオレピンIgG	血清	ELISA	1	232	10未満	10未満	U/mL	2～4
20	237	PA-IgG	保存液入全血	ELISA	23	198	46以下	46以下	ng/10*7cells	3～5
20	238	抗GAD抗体	血清	ELISA	323	134	5.0未満	5.0未満	U/mL	2～4
20	239	抗BP180抗体	血清	CLEIA	8	270	9.0未満	9.0未満	U/mL	2～4
20	240	抗JO-1抗体(CLEIA)	血清	CLEIA	168	140	10.0未満	10.0未満	U/mL	2～4
20	241	抗アクアポリン4抗体	血清	ELISA	6	1,000	3.0未満	3.0未満	U/mL	2～8

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	予定数量	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
	20	抗デズモグレイン1抗体	血清	CLEIA	3	300	20.0未満	20.0未満	U/mL	2～4
	20	抗デズモグレイン3抗体	血清	CLEIA	3	270	20.0未満	20.0未満	U/mL	2～4
	20	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	血清	RIA	5	1,000	0.02未満	0.02未満	nMOL/L	3～9
	20	抗MAC抗体	血清	EIA	3	116	0.7未満	0.7未満	U/ML	3～6
	20	抗DS-DNA IGG抗体 (ELISA)	血清	ELISA	723	168	12以下	12以下	IU/mL	2～4
	20	抗CL抗体 IgG	血清	EIA	504	232	10. 0 未満	10. 0 未満	U／mL	3～6
	21	抗ds-DNA IgG抗体	血清	ELISA	1	168	12以下	12以下	IU/mL	2～4
	21	抗ds-DNA IgM抗体	血清	ELISA	2	適用外	6未満	6未満	U/mL	2～8
	22	結核菌特異的IFN-γ	ヘパリン加血	ELISPOT	171	612	陰性	陰性	なし	3～5
	22	DLST	ヘパリン加血	3Hサイジン取込能測定法	26	3452薬剤4253薬	陰性:179 以下	陰性:179 以下	なし	8～10
	23	インターロイキン-6	血清	CLEIA	30	適用外	2.41以下	2.41以下	pg/mL	3～10
	24	MAC同定:TagManPCR	喀痰	ロシュ/リアルタイムPCR法	1	421	検出せず	検出せず	なし	2～3
	24	結核菌同定:TagManPCR	喀痰	ロシュ/リアルタイムPCR法	1	410	検出せず	検出せず	なし	2～3
	25	22Q11欠失染色体検査	ヘパリン加血	FISH法	6	3,028	なし	なし	なし	8～10
	25	先天異常染色体 G-BANDING	ヘパリン加血	分染法	18	3,028	なし	なし	なし	13～18
	26	TTR遺伝子変異解析	EDTA加血	PCR/ダイレクトシーケンス	15	3,880	設定なし	設定なし	設定なし	14～25
	27	拭きとり検査	ぬぐい液	ビフリア属菌、腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌および生菌数の培養検査	150	適用外	なし	なし	なし	3～6
	27	糞便検査	便	赤痢菌、サルモネラ菌、ビフリア属菌、腸管出血性大腸菌の培養検査	384	適用外	(-)	(-)	なし	3～7
	260	β-トロンボグロブリン	乏血小板血漿	EIA	1	177	50以下	50以下	ng/mL	2～6
	261	血小板第4因子 PF-4	乏血小板血漿	EIA	1	178	20以下	20以下	ng/mL	2～6
	262	トロンボモイチン	血漿	CLEIA	1	適用外	0.68以下	0.68以下	fmol/mL	不定期
	263	幼若血小板	血液(EDTA-2K加)	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法など	2	適用外	なし	なし	なし	3～5
	264	ICG	血清	比色法	1	100	0-10(15分血中停滞率)	0-10(15分血中停滞率)	%	2～3
	265	便消化状態	糞便	ズダンⅢ染色法	1	20	なし	なし	0	6～7
	266	25-OHビタミンD (Total)	血清	CLEIA	1	117	欠乏 20.0未満、不足 20.0-29.9	欠乏 20.0未満、不足 20.0-29.9	ng／mL	2～4
	267	ヒアルロン酸・その他	その他	ラテックス凝集免疫比濁法	1	適用外	設定なし	設定なし	ng/mL	2～4
	268	リボ蛋白分画精密測定	血清	ホリアクリルアミドゲル・ディスク電気泳動法	501	80	別紙シート参照	別紙シート参照	%	5～8
	269	ビタミンA	血清	HPLC/FL	1	適用外	27. 2—102. 7	27. 2—102. 7	μg／dL	3～6
	270	ビタミンB2	EDTA加血	HPLC	1	249	12.8-27.6	12.8-27.6	μg/dL	3～4
	271	ビタミンB6	血清	HPLC	1	適用外	PAM 0.6以下 PAL 6.0-40.0 PIN 3.0以下	PAM 0.6以下 PAL 4.0-19.0 PIN 3.0以下	ng/ml	5～7
	272	ビタミンE	血清	蛍光法	1	適用外	0. 75—1. 41	0. 75—1. 41	mg／dL	5～9
	273	ビタミンK分画	血漿	HPLC	1	適用外	ビタミンK1 :0.15～1.25 ビタミンK2:0.10以下	ビタミンK1 :0.15～1.25 ビタミンK2:0.10以下	ng/mL	5～11
	274	イオン化カルシウム	血清	イオン電極法	1	26	2.41-2.72	2.41-2.72	mEq/L	3～5
	275	水銀・血液	ヘパリン加血液	原子吸光法	1	適用外	9. 0以下	9. 0以下	μg／dL	3～23
	276	鉛・血液	ヘパリン加血	原子吸光法	1	適用外	1.0以下	1.0以下	μg／dL	2～3
	277	アルベカシ	血清	ラテックス凝集比濁法	1	470	Peak:15～20、Through1～2未満	Peak:15～20、Through1～2未満	μg/mL	2～4
	278	クロナセバム	血清	LC-MS/MS	1	470	20～70	20～70	ng/mL	3～5
	279	N-アセチルプロカイナム	血清	EIA	1	470	6.0～20.0	6.0～20.0	μg/mL	不定期
	280	プロカイナム	血清	EIA	1	470	4.0～10.0	4.0～10.0	μg/mL	2～4
	281	プロプラロール	血清	HPLC	1	適用外	50～100	50～100	ng/mL	4～10
	282	トピラマート	血漿	LC-MS/MS	1	470	設定なし	設定なし	μg/mL	3～5
	283	ガバヘンチン	血漿	LC-MS/MS	1	470	設定なし	設定なし	μg／mL	3～5
	284	炭酸リチウム:原子吸光法	血清	比色法	2	470	0.3～1.2	0.3～1.2	mEq／L	2～4
	285	VMA	血漿	HPLC	2	90	3.3-8.6	3.3-8.6	ng/mL	3～6
	286	レフチン	血清	RIA2抗体法	1	適用外	なし	なし	ng/mL	4～10
	287	遊離テストステロン	血清	RIA	1	163	別紙シート参照	別紙シート参照	pg/mL	2～5
	288	睪丸カゴン	血漿	EIA	1	150	70-174	70-174	pg/mL	5～7
	289	5-HIAA・尿	酸性蓄尿	LC-MS/MS	1	95	0.6-4.1	0.6-4.1	mg/day	3～4
	290	ガストリン	血清	RIA	1	104	37—172	37—172	pg／mL	2～5
	291	牛乳	血清	FEIA	1	110	0. 34以下	0. 34以下	UA/ml	2～3
	292	グルテン	血清	CLEIA	1	110	0. 34以下	0. 34以下	IUA/mL	2～4
	293	システロール	血清	GC法	2	適用外	なし	なし	μg/mL	1ヵ月
	294	C1インアクチベーター活性	血漿	発色性合成基質法	2	268	70～130	70～130	%	2～4
	295	α1アンチトリプシン	血清	ネフロメトリー法	1	80	94～150	94～150	mg/dL	2～4
	296	尿中IV型コラーゲン	専用容器部分尿	EIA	1	189	別紙シート参照	別紙シート参照	μg/g・CRE	3～9
	297	ECP	血清	FEIA	2	適用外	成人 14.9以下	成人 14.9以下	μg／L	2～8
	298	IgGサブクラス分画	血清	免疫比濁法およびラテックス免疫比濁法	1	適用外	別紙シート参照	別紙シート参照	mg/dL	2～6
	299	TOTAL P1NP	血清	ECLIA	1	169	男性(30～83歳):18.1～74.1	閉経前女性(30～44歳):16.8～70.1 閉経後女性(45～79歳):26.4～98.2	ng/mL	2～4
	300	尿中8-OHdG(CRE換算値)	部分尿	EIA	1	適用外	なし	なし	ng/mg・CRE	7～30
	301	遊離HCG-β	血清	IRMA	2	136	0.1以下	0.1以下	ng/ml	2～4
	302	抗p53抗体	血清	CLEIA	1	163	1. 30 以下	1. 30 以下	U／mL	3～6
	303	HCV DCV耐性変異(L31/Y93)	血清	ダイレクトシーケンス法およびCycleave PCR法	1	適用外	なし	なし	%	8～11
	304	百日咳抗体	血清	EIA	1	264	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満	EU/mL	3～5
	305	ライム病抗体	血清	ELISA免疫ブロット法	1	適用外	陰性	陰性	なし	14～21
	306	寒冷凝集反応	血清	赤血球凝集反応	3	11	64 未満	64 未満	倍	3～5
	307	アスペルギルス抗体:CF	血清	CF	1	適用外	4未満	4未満	倍	3～5

分類 番号	No.	細目名	材料	検査法	予定数量	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
	308	水痘・帯状ウイルス-DNA定量	血清	リアルタイムPCR法	1	適用外	100未満	100未満	コピー/mL	2～4
	309	単純ヘルペスウイルスDNA定量	血清	リアルタイムPCR法	2	適用外	100未満	100未満	コピー/mL	2～4
	310	ヒトヘルペスウイルス6型-DNA定量	血清	リアルタイムPCR法	2	適用外	100未満	100未満	コピー/mL	2～4
	311	HCV群別(ゲルヒンク)	血清	CLEIA	2	227	なし	なし	型	2～3
	312	マイコ核酸同定	咽頭拭い液	LAMP法	1	300	検出せず	検出せず	0	3～4
	313	パルボB19:PCR	血清	PCR法	2	適用外	検出せず	検出せず	なし	5～7
	314	ニューモシスティスカリニ:PCR	呼吸器系材料	PCR法	1	適用外	検出せず	検出せず	なし	5～7
	315	CMV-DNA定	血清	リアルタイムPCR法	1	適用外	100 未満	100 未満	コピー/mL	2～4
	316	EBVリンパ	EDTA加血液	リアルタイムPCR法	1	適用外	10 未満	10 未満	コピー/μg	3～5
	317	中～高リスク型 HPV-DNA同定	拭い液	ハイブリッド	2	350	陰性 INDEX1.00未満	陰性 INDEX1.00未満	なし	2～3
	318	HIV-2:ウエスタンブロット	血清	ウエスタンブロット法	3	380	陰性 (ー)	陰性 (ー)	なし	3～9
	319	抗Jo-1抗体	血清	オクタロニー法	1	140	陰性	陰性	倍	3～5
	320	抗プロトン抗体	血清	ELISA	1	適用外	12未満	12未満	UNIT	5～16
	321	抗平滑筋抗体	血清	FA	2	適用外	陰性 (40未満)	陰性 (40未満)	倍	2～4
	322	抗内因子抗体	血清	CLEIA	2	適用外	(-)	(-)	なし	2～6
	323	抗LKM-1抗体	血清	ELISA	1	221	17未満	17未満	なし	2～4
	324	抗GM1 IGG抗体	血清	ELISA	1	460	0.400未満	0.400未満	なし	8～10
	325	抗GQ1B IGG抗体	血清	ELISA	1	460	0.400未満	0.400未満	なし	8～10
	326	ICA-IgG(ランゲルハンス細胞質	血清	免疫蛍光抗体間接法	1	適用外	陰性 (1.25未満)	陰性 (1.25未満)	JDF UNITS	2～3
	327	抗IA-2抗体	血清	ELISA	2	213	0.6未満	0.6未満	U/mL	3～6
	328	抗SS-DNA IGM抗体 (ELISA)	血清	ELISA	1	適用外	17未満	17未満	U/mL	2～8
	329	亜鉛トランスポーター-8(ZNT8)抗体	血清	ELISA	1	適用外	15.0未満	15.0未満	U/mL	5～16
	330	腫瘍壊死因子-α	血清	CLEIA	1	適用外	1.79以下	1.79以下	pg/mL	7～14
	331	VEGF	血漿	ELISA	2	適用外	38.3以下	38.3以下	pg/mL	7～14
	332	インターロキン-10	血清	ELISA	1	適用外	2.03以下	2.03以下	pg/mL	7～14
	333	TARC(TH2ケモカイン)	血清	CLEIA	1	184	6か月～12ヵ月:未満 1367未満、1～2歳未満:998未満 2歳以上:743未満 成人:450未満	6か月～12ヵ月:未満 1367未満、1～2歳未満:998未満 2歳以上:743未満 成人:450未満	pg/mL	2～4
	334	インターロキン-2:ELISA	血しょう	EIA	1	適用外	設定なし	設定なし	pg/mL	不定期
	335	トキソプラズマ IGG抗体	血清	CLEIA法	6	93	1. 6未満	1. 6未満	IU/mL	2～3
	336	クリプトコカス抗体(S)	血清	試験管凝集法	1	適用外	2未満	2未満	倍	16～18
	337	アスベルギルス抗体	血清	オクタロニー法	2	適用外	陰性	陰性	なし	7～9
	338	菌株同定1菌種	菌株	菌種による	1	適用外	菌種による	菌種による	なし	5～15
	339	STDマイコプラズマ同定	尿	PCR/	1	300	検出せず	検出せず	なし	3～4
	340	EGFR変異解析 V2.0	未染標本スライド	PCR(リアルタイムPCR)	1	2,500	なし	なし	なし	5～7
	341	DMキナーゼ DNA サザン	血液(EDTA-2Na加)	サザン/ハイブリダイゼーション法	2	3,880	なし	なし	なし	14～22
	342	JAK2V617F変異相対定量解析	骨髓液	リアルタイムPCR法	1	2,504	検出せず	検出せず	なし	4～10
	343	ジストロフィン遺伝子変異解析	血液	MLPA	2	3,880	設定なし	設定なし	設定なし	7～21
	344	白血球A-GAL A	EDTA-2Na加血	人工基質法	152	3880	49.8-116.4	49.8-116.4	nmol/mg protein/時間	14～28
	345	白血球α-グルコシダーゼ	EDTA-2Na加血	人工基質法	1	3880	13.1-46.3	13.1-46.3	nmol/mg protein/時間	14～28
	346	LPF:PAG	血清	ポリアクリルアミドゲル・ディスク電気泳動	63	80	HDL: 22～50、LDL: 44～69、VLDL: 5～20	HDL: 26～53、LDL: 42～65、VLDL: 4～17	%	5～7
	347	SD-LDL	血清	直接法	15	適用外	男性 21～44歳 9.5～42.5(mg/dL) 男性 45～75歳 10.7～48.7(mg/dL)	女性 21～54歳 9.5～42.5(mg/dL) 女性 55～75歳 10.7～48.7(mg/dL)	mg/dL	2～4