

外部委託検査細目内訳書 別紙②

【レニン活性】

|    | 基準値(ng/mL/hr) |
|----|---------------|
| 臥位 | 0.2～2.3       |
| 座位 | 0.2～3.9       |
| 立位 | 0.2～4.1       |

【プロジェステロン】【E2】

|    |              | プロジェステロン基準値 (ng/ml) | E2基準値 (pg/mL) |
|----|--------------|---------------------|---------------|
| 男性 |              | 0.22以下              | 14.6～48.8     |
| 女性 | 卵胞期(前期)      | 0.28以下              | 28.8～196.8    |
|    | 排卵期          | 5.69以下              | 36.4～525.9    |
|    | 黄体期(前期)      | 2.05～24.2           | 44.1～491.9    |
|    | 閉経後          | 0.33以下              | 47.0以下        |
| 妊婦 | 妊娠初期(4～13週)□ | 13.0～51.8           | 208.5～4289    |
|    | 妊娠中期(14～27週) | 24.3～82.0           | 2808～28700    |
|    | 妊娠後期(28～38週) | 63.5～174            | 9875～31800    |

【脂肪酸4分画】

| 分画成分名         | 基準値(μg/ml)  |
|---------------|-------------|
| アラキドン酸        | 135.7～335.3 |
| エイコサペンタエン酸    | 10.2～142.3  |
| ジホモ-γ-リノレン酸   | 22.6～72.5   |
| ドコサヘキサエン酸     | 54.8～240.3  |
| EPA/AA比       | 0.05～0.61   |
| DHA/AA比       | 0.27～1.07   |
| (EPA+DHA)/AA比 | 0.32～1.66   |

【テストステロン】

|    | 基準値(ng/mL) |
|----|------------|
| 男性 | 1.31～8.71  |
| 女性 | 0.11～0.47  |

【遊離テストステロン】

|        | 基準値(pg/ml) |         |
|--------|------------|---------|
| 年齢     | 男性         | 女性      |
| 20～29歳 | 7.6～23.8   | 0.4～2.3 |
| 30～39歳 | 6.5～17.7   | 0.6～2.5 |
| 40～49歳 | 4.7～21.6   | 0.3～1.8 |
| 50～59歳 | 4.6～19.6   | 0.8～1.7 |
| 60～69歳 | 5.3～11.5   |         |
| 70歳以上  | 4.6～16.9   |         |

【IgGサブクラス分画】

|      | 基準値(mg/dL) |
|------|------------|
| IgG1 | 351～962    |
| IgG2 | 239～838    |
| IgG3 | 8.5～140    |
| IgG4 | 4.5～117    |