

【参考】外部委託検査細目内訳

資料②

分類 番号	契約No.	細目名	材料	検査法	予定数量 (R8.12-R10.5)	保険点数	基準値(男)	基準値(女)	単位	日数
1	1	トロンボモジュリン	血清	CLEIA	399	204	12.1-24.9	12.1-24.9	U/mL	2~4
1	2	プロテインS抗原量(トータル)	血漿(クエン酸Na)	ラテックス凝集反応	651	152	65 - 135	65 - 135	%	2~4
1	3	凝固活性 第Ⅱ因子(F2)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	11	223	66.0 -118.0	66.0 -118.0	%	2~4
1	4	凝固活性 第Ⅴ因子(F5)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	8	223	73.0 -122.0	73.0 -122.0	%	2~4
1	5	凝固活性 第Ⅶ因子(F7)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	8	223	54.0 -162.0	54.0 -162.0	%	2~4
1	6	凝固活性 第Ⅷ因子(F8)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	537	223	78.0 -165.0	78.0 -165.0	%	2~4
1	7	凝固活性 第Ⅸ因子(F9)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	6	223	67.0 -152.0	67.0 -152.0	%	2~4
1	8	凝固活性 第Ⅹ因子(F10)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	11	223	58.0 -200.0	58.0 -200.0	%	2~4
1	9	凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	6	223	75.0 -137.0	75.0 -137.0	%	2~4
1	10	凝固活性 第ⅩⅡ因子(F12)	血漿(クエン酸Na)	凝固時間法	14	223	36.0 -152.0	36.0 -152.0	%	2~4
1	11	フォン・ウィルブラント因子活性	血漿(クエン酸Na)	固定血小板凝集法	171	126	50 - 150	50 - 150	%	2~4
1	12	α2PI7ラズミン複合体(PIC)	血漿(クエン酸Na)	LPIA	530	150	0.8 以下	0.8 以下	μg/mL	2~4
1	13	ADAMTS-13(活性)	血漿(クエン酸Na)	ELISA	164	400	活性(IU/mL):0.10以上 (IU/mL) 活性(%):10以上 (%)	活性(IU/mL):0.10以上 (IU/mL) 活性(%):10以上 (%)	(IU/mL)、(%)	5~7
1	14	HIT-IgG	血漿(クエン酸Na)	ラテックス比濁法	182	376	1.00未満	1.0 未満	U/mL	2~6
1	15	凝固抑制 第Ⅷ(8)因子	血漿(クエン酸Na)	ヘセスタ法	2	144	1.0以下	1.0以下	BU/mL	2~4
1	16	血小板第4因子 PF-4	乏血小板血漿	EIA	5	173	20以下	20以下	ng/mL	2~9
1	17	ループスアンチコアグulant	血漿(クエン酸Na)	リン脂質中和法	1,058	265	1.16以下	1.16以下	なし	2~4
2	18	アデノシンテアミナーゼ	血清	酵素法	60	32	4.8 - 23.1	4.8 - 23.1	U/L	2~4
2	19	リゾチーム	血清	比濁法	20	適用外	5.0 - 10.0	5.0 - 10.0	μg/mL	2~4
2	20	LDアイツザイム	血清	アガロース電気泳動法	36	48	別紙シート参照	別紙シート参照	%	2~4
2	21	ALPアイツザイム	血清	アガロース電気泳動法	3	48	別紙シート参照	別紙シート参照	%	2~4
2	22	アミラーゼアイツザイム	血清	アガロース電気泳動法	20	48	TOTAL-S 36.0-84.3 TOTAL-P 15.7-64.0	TOTAL-S 36.0-84.3 TOTAL-P 15.7-64.0	%	2~4
2	23	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール	血清	酵素法	440	80	14.0以上	14.0以上	μg/mL	2~4
2	24	アミノ酸分画	血漿(EDTA2Na)	LC/MS	62	1,074	別紙シート参照(シスチン:11.7~35.4)	別紙シート参照(シスチン:11.7~35.4)	nmol/mL	4~6
2	25	アミノ酸分画(尿)	尿	HPLC	11	1,074	別紙シート参照	別紙シート参照	μmol/day	4~11
2	26	骨型アルカリフォスファターゼ	血清	CLEIA	2	157	3.7-20.9	閉経前 2.9~14.5 閉経後 3.8~22.6	μg/L	2~4
3	27	オリゴクロナルバンド	髄液および血清	等電点電気泳動法	39	507	検出せず	検出せず	なし	10~14
3	28	IgG(髄液)	髄液	免疫比濁法	92	38	設定なし	設定なし	mg/dL	2~4
3	29	IgM(髄液)	髄液	免疫比濁法	14	38	設定なし	設定なし	mg/dL	2~4
3	30	IgA(髄液)	髄液	免疫比濁法	12	38	設定なし	設定なし	mg/dL	2~4
3	31	アルブミン(髄液)	髄液	免疫比濁法	56	99	2~20	2~20	mg/day	2~4
3	32	ミエリンベースック蛋白	髄液	ELISA	21	570	102以下	102以下	pg/mL	不定期
3	33	β-アミロイド1-42/1-40比	髄液	CLEIA	182	1,282	β A1-42 なし β A1-40 なし β A1-42/1-40比 髄液 0.067以上	β A1-42 なし β A1-40 なし β A1-42/1-40比 髄液 0.067以上	β A1-42 pg/mL β A1-40 pg/mL β A1-42/1-40比 なし	2~8
19	34	血液・穿刺液検体	血液・穿刺液材料	Bergey's Manual他に基づく同定法	11	240	設定なし	設定なし	なし	4~7
19	35	抗酸菌同定	細菌検査材料	質量分析法	5	376	設定なし	設定なし	なし	2~5
分類外	36	TTR遺伝子変異解析	EDTA加血	PCR/ダイレクトシーケンス	29	3,880	設定なし	設定なし	設定なし	14~25
分類外	37	EBVリンパ	EDTA加血液	PCR(リアルタイムPCR)	572	310	ケンシュツセズ	ケンシュツセズ	(Log IU/mL	2~4
分類外	38	ヒト癌胎児性 フィブロネクチン	腔分泌物	ELISA	48	204	陰性	陰性	なし	2~4
分類外	39	FTA-ABS IgG	血清	FAT	18	134	(-)	(-)	-	2~4